Тристел

Фьюз для Поверхностей

Спороцидное дезинфицирующее средство

СРЕДСТВО ФЬЮЗ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ:

- **помещений типа операционной, изоляторов, бокса, приемного покоя и пр.**
- **поверхностей медицинских приборов и оборудования**
- **операционных, пеленальных, родильных столов**
- **гинекологических и стоматологических кресел**
- **предметов ухода за больными, игрушек из непористых, гладких материалов**
- **поверхностей кувезов для новорожденных**
- **осветительной аппаратуры, жалюзей и т.п.**

ФЬЮЗ ОБЛАДАЕТ АНТИМИКРОБНОЙ И СПОРОЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ В ОТНОШЕНИИ:

грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций, кишечных инфекций), вирусов (включая аденовирусы; вирусы гриппа, парагриппа, птичьего, свиного гриппа и другие типы вируса гриппа; возбудителей острых респираторных инфекций; энтеровирусы; ротавирусы; вирус полиомиелита; вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, а также возбудителей анаэробных инфекций.

Диоксид хлора активно разрушает на поверхностях биологические пленки и не обладает фиксирующим действием.

Каждое саше Фьюз содержит два раствора:

- 50 мл База (5% раствор лимонной кислоты и ПАВ в деминерализованной воде)
- 50 мл Активатор (2,1% раствор хлорита натрия в деминерализованной воде)

При смешивании растворов База и Активатор образуется диоксид хлора.

Для приготовления рабочего раствора одно саше смешанного раствора добавляется в 5 литров воды.

TRI/FUS/206/Issue3_SurfUG_RUS.indd 1 30/11/2012 11:24

Тристел

Краткая инструкция по применению Фьюз для Поверхностей

Подробный способ применения изложен в «Инструкции №1 по применению дезинфицирующего средства «Тристел Фьюз для Поверхностей» компании «Тристел Солюшенс Лимитед», Великобритания»

1. Возьмите одно саше для приготовления 5 литров раствора диоксида хлора.

2. Согните саше пополам. Зажмите одну сторону саше, чтобы прорвать внутреннюю разделяющую мембрану и смешать два раствора. При реакции двух компонентов раствор приобретает желтый цвет.

3. Отрежьте или оторвите угол саше.

4. Добавьте содержимое саше (100мл) в 5 л водопроводной воды. Чтобы избежать разбрызгивания концентрата при наливании, рекомендуется опустить надрезанный угол саше в воду.

5. Время дезинфекционной выдержки при обработке – 5 минут.

Фирма-изготовитель:
«Тристел Солюшенс Лимитед»,
Великобритания
www.tristel.com

Дистрибьютор в России:
Филиал компании
«Тристел Интернешнл Лимитед»
Московская обл., г. Мытищи
ул. Колонцова, д.5, офис 109
8 (495) 973 33 93
info@tristelrussia.ru
www.tristelrussia.ru

Срок годности и номер партии указаны на саше.
Хранить саше в месте защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +10°C до +35°C.

CE 0086

10°C – 35°C

TRI/FUS/206/Issue 3